

あなたのネコちゃんに最適なワクチンどれ？ 通院前のセルフチェック

結果

室内飼育でも2歳未満の若いネコちゃんは感染リスクが高いため、猫白血病ウイルス感染症の予防ができる〈4種または5種ワクチン〉がおすすめ。

ネコちゃんの年齢や生活環境によっても異なりますので、
詳しくは動物病院でご相談ください

猫白血病の
リスクチェック

外出は猫白血病のリスク大

☐ 外に出るのが好き☐ 庭やベランダに出ることがある☐ 外に出る猫と室内飼いの猫をいっしょに飼っている

NO

あなたの選択

ひとつでも当てはまる場合は YES

↓

猫ちゃんの年齢は？

☐ おとな（2歳以上）☐ 若い（2歳未満^{*1*2}）

あなたの選択

猫白血病ウイルスの陽性率^{*3}

- 週1回以上外出する猫で平均12.2%
- 年齢別のピークは2歳齢で21.7%

さまざまな感染経路



スキンシップ



ケンカ



グルーミング



食器の共有

完全室内飼育でも
ワクチン接種をおすすめします。

4種・5種ワクチンの接種をおすすめします。

*1 Little S, et al. 2020 AAFP Feline Retrovirus Testing and Management Guidelines. J Feline Med Surg. 2020 Jan;22(1):5-30.

*2 Squires RA, et al. 2024 guidelines for the vaccination of dogs and cats - compiled by the Vaccination Guidelines Group (VGG) of the World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). J Small Anim Pract. 2024 May;65(5):277-316.

*3 Watanabe S, et al. PLoS One. 2013 Apr 11;8(4):e61009.

ワクチン接種で予防できる病気

	主な症状	3種ワクチン	4種ワクチン	5種ワクチン
猫ウイルス性鼻気管炎	● 咳、くしゃみ、鼻水、目やに	●	●	●
猫カリシウイルス感染症	● 口内炎、口腔潰瘍、舌潰瘍 海外では致死率の高い株の報告あり*	●	●	●
猫汎白血球減少症	● 激しい嘔吐、下痢・血便 ● 死亡率が高い	●	●	●
猫白血病ウイルス感染症	● 貧血、リンパ腫 ● 免疫力の低下		●	●
猫クラミジア感染症	● 目やに			●

* 強毒全身性猫カリシウイルス感染症 (VS-FCV)

予防がいちばんキャンペーン

対象のワクチンを接種後、お申込み頂いた方々から選考で
愛猫のイラスト or 「ねこのきもち」裏表紙掲載権 or オリジナルカレンダー
「ねこのきもち」2026年12月号（予定）写真掲載

詳しくはこちら



※企画は予告なく変更になる場合があります。



Boehringer
Ingelheim

ベーリンガーインゲルハイム
アニマルヘルスジャパン(株)